Click to verify

Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. Nombres comerciales: Avelox, Avestrep, Bancifar, Esthipia, Pixiriv, Vigamoxi, etc. Nombre genérico: Moxifloxacino. Sirve para: Infecciones bacterianas. El Moxifloxacino, también conocido como Moxifloxacina, es un antibiótico utilizado para eliminar las bacterias que causan diversas infecciones en las vías respiratorias, además de otras enfermedades. Sirve principalmente para los siguientes padecimientos: Neumonía adquirida en la comunidad, padecimiento infeccioso bacteriano que se contrae por diversos microorganismos fuera de los hospitales. Sinusitis, inflamación de los senos de las cavidades nasales como consecuencia de una infección por bacterias. Bronquitis crónica, inflamación de los bronquios como consecuencia de una infección bacteriana. Salpingitis, inflamación por infección de las trompas de Falopio. Endometritis, inflamación del endometrio por infección con bacterias. Conjuntivitis bacteriana. Pie diabético, para la infección por bacterias que generalmente presentan las lesiones o ulceraciones. Infecciones de la piel complicadas o no complicadas. Abscesos y otras infecciones del abdomen. Diversas infecciones bacterianas de los genitales femeninos. El uso de cualquier antibiótico debe ser prescrito por un médico, ya que diversos padecimientos se parecen en los síntomas pero pueden estar ocasionados por virus, contra los que este medicamento no surte efecto. Debe usarse en las dosis señaladas por el médico y hasta completar el tratamiento, independientemente de que los síntomas hayan desaparecido. Presentaciones y forma de administración Tabletas de 400 mg de Moxifloxacino en presentación de cajas con 5 o 7 tabletas. Son fabricadas por los Laboratorios Bayer de México, Serral, Nafar, Siegfried Rhein, Pisa, Liomont y otros, en marcas comerciales como Avelox, Avestrep, Bancifar, Esthipia, Pixiriv, Zinolox 4G y varias más, incluyendo genéricos. Solución oftálmica de 5 mg/ml, en frasco gotero con 5 ml. Es fabricada por Alcon Laboratorios en la marca comercial Vigamoxi. Solución inyectable con 400 mg, disponible en bolsa estéril o frasco ámpula con 5 ml. Es fabricada por Bayer de México bajo la marca comercial Avelox. Dosis y usos recomendados por edad Presentación 0 a 18 años Adultos Veces al día Tabletas No 400 mg 1 Solución oftálmica No 1 gota por ojo 3 Solución inyectable No 400 mg 1 *Consulta a tu médico para recibir el uso y dosis correcta. El tiempo de tratamiento mediante tabletas o infusión intravenosa va desde los 5 hasta los 21 días, dependiendo del tipo de padecimiento y la gravedad. La infusión se debe aplicar en un lapso superior a 1 hora. La dosis por vía oral se puede tomar con o sin alimentos. Para el tratamiento en gotas para los ojos, el tiempo normal de tratamiento es de 4 días. El tratamiento de los padecimientos de neumonía, infecciones complicadas de la piel, tejidos blancos e intra abdominales puede comenzar por vía intravenosa, pero debe cambiarse en cuanto sea posible a la vía oral. Generales. No se debe administrar el medicamento a personas con bajos niveles de potasio en la sangre o con padecimientos del corazón. Alergias o hipersensibilidad. No debe usarse en personas sensibles a las quinolonas. Mezcla con alcohol. El alcohol es una droga que agrede al organismo, lo que puede provocar un aumento en el riesgo de provocar efectos secundarios junto con el medicamento. Mezclar con otros medicamentos. No se debe combinar con medicamentos antiarrítmicos. Se debe tener precaución con los antiácidos, complementos vitamínicos, minerales, Eritromicina, Cisaprida, medicamentos antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos y otros. Combinación del Moxifloxacino en embarazo y lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El Moxifloxacino es catalogado por la FDA (Food and Drug Administration) como un medicamento de riesgo tipo C, en el que se ha comprobado daño fetal en animales. No se tienen estudios en personas, por lo que su uso está reservado a aquellos casos en que los beneficios para la madre superen los riesgos para el bebé. Según estudios citados por e-lactancia.org, el Moxifloxacino pudiera ser de bajo riesgo, por comparación de sus características con otros antibióticos estudiados como el Ciprofloxacino. La FDA indica que no se tienen datos suficientes para aprobar o rechazar su uso, pero considera que es viable en tratamientos de corto plazo. Indica también que se han comprobado daños en animales inmaduros como la erosión de cartílagos y articulaciones. Efectos secundarios Existe una gran cantidad de efectos secundarios que se pueden presentar al utilizar este medicamento. Los que pueden afectar a más de 1 de cada 100 personas son: Sistema nervioso central – Mareos y dolor de cabeza. Aparato digestivo – Dolor abdominal, diarrea, náusea y vómito. Infecciones por hongos. Con estos otros efectos puede afectar a entre 1 y 10 personas de cada 1000 que usan la medicina: Aparato digestivo – Falta de apetito, dispepsia, estreñimiento, flatulencias y gastroenteritis. Sistema nervioso central – Alteración del sentido del gusto, desorientación, confusión, ansiedad, agitación, somnolencia, pesadillas, temblores, vértigo, etc. Aparato circulatorio – Palpitaciones, dilatación de los vasos sanguíneos, taquicardia, etc. Trastornos músculo esqueléticos – Dolores musculares y articulares. Composición de la sangre – Disminución en el número de plaquetas, glóbulos blancos o leucocitos, aumento en el número de plaquetas, elevación de colesterol y triglicéridos, etc. Con una incidencia menos a 1 de cada 1000 personas también se pueden presentar los siguientes efectos colaterales: Aparato digestivo – Colitis. Sistema nervioso central – Trastornos en el sentido del olfato, falta de coordinación de movimientos, convulsiones, aumento de la sensibilidad con presencia de dolor, reacciones psicóticas, despersonalización, cambios de humor, depresión, alucinaciones, etc. Aparato circulatorio – Disminución o aumento de la presión arterial, arritmias, paro cardiaco, etc. Trastornos músculo esqueléticos – Inflamación o ruptura de tendones, calambres, aumento del tono muscular, inflamación de articulaciones, etc. Composición de la sangre – Aumento de la glucosa, ácido úrico, etc. Trastornos en la piel y tejidos blandos – Formación de ampollas, zonas de piel muerta, etc. Sistema urinario – Disminución de las funciones de los riñones o insuficiencia renal. Reacciones alérgicas – Inflamación de la laringe, reacción anafiláctica, hinchazón de la cara y otras partes, etc. Cualquier efecto secundario en la piel como erupciones o que indiquen una respuesta alérgica, es motivo suficiente para suspender el tratamiento y se debe acudir de inmediato a un hospital. Sobre cualquier otro efecto colateral se debe informar al médico para que realice los ajustes necesarios o decida sobre la continuidad del tratamiento