I'm not a bot

pdf المتلازمة الكبدية الكلوية aasld إرشادات

المتلازمة الكبدية الكلوية (HRS) هي خالة خطيرة للغاية ومهددة للحياة وتؤثر على وظائف الكلى لدى بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المتقدمة HRS. هي الأكثر شيوعًا بين الأشخاص المتقدمين التليف الكبدي (تندب الكبد) ويحدث دائمًا تقريبًا عند المصابين استسقاء (تراكم السوائل في منطقة البطن المرتبطة بتليف الكبد). ومنظرًا لخطورة هذه الحالة، يجب على علبي المريض ومقدم الرعاية. ترتبط متلازمة الكبد الكلوي الآن ارتفاع في معدلات الوفيات بشكل كبير، لذلك، يجب على جميع المرضى الذين يعانون من تليف الكبد والاستسقاء فحص الكريناتينين في الدم لديهم بشكل منتظم. وشكل مبكر جدًا إذا كانوا يتناولون مدرات البول. وخاصة إذا تم زيادة جرعة مدرات البول أو إذا تمت إضافة مدر بول جديد. إن إجراء اختبارات الكريناتينين في الدم ومراقبتها من قبل طبيب خبير - وتلقي العلاج المناسب - يمكن أن يؤثر على مدة بقاء الشخص على قيد الحياة. اختبار الكريناتينين في الدم ليس الطريقة الوحيدة لتشخيص HRS-AKI. يتم وضع علامة kcom.idney injury ويسمى 5 إلى 97.2 ميكرومول/لتر) من المهم معرفة مستوى الكريناتينين لديك في وقت مبكر من الاختبارات الطبية. وبهذه الطريقة، إذا تغيرت الأمور أو عندما تتغير، سنكون هناك طريقة لمقارنة الرقم الأصلي بالرقم المتزايد ومراقبة مدى سرعة حدوث أي تغييرات. لذلك، يجب على جميع المرضى الذين يعانون من تليف الكبد والاستسقاء فحص الكريناتينين في الدم ومراقبتها من قبل طبيب خبير. - يمكن أن يؤثر على مدة بقاء الشخص على قيد الحياة. اختبار الكريناتينين في الدم ليس الطريقة الوحيدة لتشخيص HRS-AKI. هو محاولة تحسين وظائف الكبد ومنع إصابة الكلى. ملف الخطة صراف هو الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج HRS-AKI. على تحسين تجربة الإرضاء في أي بيئة. نادي الاستسقاء الدولي، وهي منظمة تشجع البحث العلمي في مجال تليف الكبد المتقدم ومضاعفاته، وضعت معايير محددة لتشخيص TXNUMXM كلمن لتوفر طبعا من الإرضاء الذاهنة إلى النارة. وبالإضافة إلى الحدولة الذكه والتحكم الصوتي، يعمل XNUMX كلمن إلى XNUMX كلمن إلى XNUMX مما يمكن أن يختلف كمية السائل. ولكن عائلا ما تتم إزالة عدة لترات من خلال إجراء بسمى البزل. كما سنتم توفير الأدوية المذكورة أعلاه. من المتوقع أن يتعرض الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب (ICU) فقد يكون الأمر محبطًا ومربكًا للمرضى ومقدمي الرعاية لهم أو أحبائهم. إذا تدهورت صحة المريض، فمن الممكن تغيرات بحتية تختبر علاجات جديدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة. يمكنك العثور على المزيد حول التجارب السريرية في أسفل هذه الصفحة والتحدث مع الطبيب لمعرفة ما إذا كانت التجارب السريرية مناسبة لك. في حالة حدوث المتلازمة الكبدية الكلوية (HRS) التجارب السريرية هي وحدة العناية المركزة (ICU). وفقًا للحالة، سيتم وضعه في وحدة العناية المركز