

Click to prove
you're human



Mis queridas lectoras, de nuevo me da mucho gusto volver por aquí, en este espacio creado exclusivamente para ustedes. Para una buena salud femenina es necesario estar en constante vigilancia de nuestra zona íntima con la intención de prevenir y detectar enfermedades a tiempo. Si has notado que con frecuencia tienes infecciones vaginales continúa leyendo, pues te dire que es la razón más probable de su aparición. ¿En qué consiste el ectropión cervical? El ectropión cervical o eversion glandular es una variante anatómica del cuello del útero que puede aparecer desde que naces o después de tener un bebé. Está presente cuando el cuello del útero tiene cubierta la superficie exterior por el tejido. Normalmente este tejido únicamente recubre el interior del cérvix y no su parte externa. El ectropión cervical produce moco excesivo y hace que la zona que se encuentra alrededor del orificio cervical se note enrojecida. ¿Por qué aparece el ectropión cervical? El ectropión cervical tiene que ver con cambios hormonales en la mujer. Se forma después del nacimiento de un bebé si es que el cérvix sufrió laceraciones. Síntomas del ectropión cervical Por lo general, la eversion glandular o ectropión cervical no tiene ningún síntoma. De hecho, la forma más común de detectarlo es a través de una exploración durante una consulta ginecológica. Por lo tanto, no prescribo ningún tratamiento cuando detecto la presencia del ectropión cervical, a menos que la paciente padezca infecciones frecuentes, ya que éstas pueden llegar a afectar el cuello del útero. ¿Cuál es la razón de las constantes infecciones? En la vagina existen diversos microorganismos como lactobacilos, bacilos, cocos, etc., conocidos como flora vaginal, que se encarga de proteger esa mucosa frente a infecciones o agresiones externas. Si el equilibrio de la flora vaginal se altera, pueden proliferar las bacterias y agentes que causan las llamadas infecciones vaginales. En este caso, el ectropión crea un desequilibrio en el interior del ecosistema vaginal. Además de esto, un cérvix con ectropión es más vulnerable a los agentes infecciosos, que pueden afectar la vagina al tener actividad sexual. ¿Qué pasa si no se le da tratamiento a una infección vaginal? Cuando las infecciones no son tratadas con el cuidado necesario, éstas podrían extenderse hasta las trompas de Falopio y los ovarios, lo cual puede causar daños irreversibles. Para eliminar el ectropión cervical se puede realizar la cauterización, que consiste en "quemar" el tejido con el propósito de que se cree uno nuevo con características "normales". Pero esto sólo se practica en el caso de que la paciente sufra infecciones frecuentes en el cérvix. Si al tener relaciones sexuales detectas que hay sangrado, puede ser una señal de alerta que indica que tu vida podría estar en riesgo, por lo que es importante que acudas a un centro médico para saber cuál es la raíz del problema. ¿Recuerdas que siempre hay solución cuando un problema se detecta a tiempo? Deja un comentario/ Ginecología/ Por Clínica Merced Inicio / Especialidades /Ortopedia/Pregunta médicaInformación nacionalHoy día yo tenía, me mandaron óvulos, y ahora lo tengo otra vez pero tal vez es el mismo, y a veces me me pican y me sale mucho flujo.Preguntado por mujer de 20 años visible313 vistasNuestro profesional de salud respondióEl ectropion o eversion glandular en el cervix, es un proceso normal y fisiológico en las mujeres, que se puede presentar habitualmente en mujeres de 14 a 37 años, ya que es más frecuente en mujeres que están en edad reproductiva, así mismo se puede presentar en las embarazadas y en paciente que llevan muchos tiempo tomando anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, que con el paso del tiempo tiende a desaparecer, algunas veces puede generar mucho flujo vaginal, y los tratamientos irán dirigidos a las complicaciones que se presenten. Espero haber resuelto tu inquietud y que esta información te haya resultado útil, si tienes otras preguntas no dudes en escribirnos.Contenido Relacionado La Eversión Glandular es un proceso normal y fisiológico que se conoce como la presencia en el endocérvix de la mucosa endocervical con su epitelio columnar a modo de eversion, que se puede presentar de forma y tamaño variable. El origen de la eversion glandular está relacionado con las infecciones de transmisión sexual, así como la carga hormonal durante el embarazo y la ingesta de anticonceptivos. ¿Cuándo se presenta la eversion glandular? La Eversión Glandular suele presentarse a las mujeres con vida sexual entre los 18 y 50 años, en las embarazadas, en pacientes con uso prolongado de anticonceptivos y terapia hormonal de reemplazo. La presencia de la eversion glandular está asociada a la presencia de estrógenos, por lo que es raro observar en la etapa posterior a la menopausia. Esta Eversión Glandular es productora de moco y sangrado al tacto y es destacado el epitelio glandular expuesto, tiene una inmunidad celular abatida o disminuida, por lo que presenta una mayor predisposición a replicar infecciones por agentes externos como Herpes, Virus del Papiloma Humano (VPH), Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH), Chlamydia y Neisseria entre otros. ¿Cuál es el tratamiento de la eversion glandular? Los métodos de diagnóstico inicial son la observación directa o a través de la colposcopia. Es de reconocer que su persistencia y recurrencia pueden ser la base para la generación de lesiones precursoras del cáncer que se originan a partir de los epiteliales plano estratificado o glandular del cuello uterino. El objetivo fundamental de la colposcopia es proponer una clasificación por etapas de la eversion del epitelio cilíndrico cervical, tomando en cuenta su tamaño y su localización en el cuello uterino. El tratamiento va a depender de la etapa en que se encuentre el paciente. Estos tratamientos ayudan a retirar el tejido ulcerado, permitiendo la cicatrización del tejido y la regeneración del cuello uterino. Con estos tratamientos los pacientes obtienen una pronta recuperación, la cual es aplicable para los diferentes niveles de edad, incluyendo edades extremas de la vida. Conozca a nuestro Staff Médico que cumple con las certificaciones adecuadas para proteger el bienestar de cada uno de nuestros pacientes. El ectropión cervical (o eversion glandular en el cérvix) es una afección del aparato reproductor femenino por la cual las células que revisten el canal cervical se extienden a la superficie externa del cuello uterino, pudiendo llegar hasta la vagina. Se considera relativamente común en mujeres en edad reproductiva, y tiene mayor presencia en embarazadas, en adolescentes y en pacientes con uso prolongado de anticonceptivos o terapia hormonal substitutiva. Habitualmente el ectropión cervical es una dolencia asintomática, pero el aumento significativo del flujo vaginal o el manchado durante o tras la penetración pueden ponernos alertas sobre su presencia. Por otra parte, y aunque las lesiones leves del ectropión cervical no impiden el embarazo, su tratamiento en determinados casos es recomendable para evitar posibles infecciones que pongan en riesgo a la mamá o al bebé. ¿Qué es el ectropión cervical? Definición Empezaremos por explicar qué es el ectropion cervical. Como ya sabes, el cuello uterino es la parte inferior y estrecha del útero, y forma un canal desde la base de este hasta la vagina. En esta zona hay una elevada concentración de células especializadas (células epiteliales) que son las encargadas de formar el tejido que lo reviste, conocido como «epitelio columnar central». Una de las características de las células del epitelo columnar central es que ayudan a que los tejidos se expandan o flexionen según sea necesario durante el parto. En algunas ocasiones, este revestimiento se desprende lentamente del cuello uterino y se desliza hacia la cavidad vaginal, formando una protuberancia. Como resultado, se produce una inflamación o infección o cervicitis, que puede afectar con mayor frecuencia un cuello de útero alterado. El ectropión crea un desequilibrio en el interior del ecosistema vaginal y puede hacer que los microorganismos presentes en la vagina, que generalmente son inofensivos, proliferen de una manera anormal y se vuelvan agresivos. Para su diagnóstico, por lo tanto, es necesario realizar un examen pélvico que, según el caso, incluirá el examen de Papanicolaú (citología cervical) y la colposcopia. Estas pruebas permitirán observar el cuello del útero y la herida, y evaluar el tamaño y características físicas y celulares de la segunda. Puesto que el origen de esta afección se relaciona con la acción de los estrógenos, se asocia con alteraciones hormonales de la pubertad, la menopausia, el embarazo o los tratamientos anticonceptivos orales. Otras causas del ectropión cervical son lesiones después del parto, alergias a productos de higiene íntima o profilaxis como preservativos o tampones, candidiasis de repetición o infecciones no tratadas (VPH, clamidia, candidiasis, herpes, gonorrea, sífilis, etc.). Síntomas: Respecto a sus síntomas, varían mucho en cada mujer y pueden ser imperceptibles. El malestar en la zona pélvica, la comezón al orinar o el flujo vaginal amarillento y de olor fuerte son recurrentes. En los casos más graves, se puede experimentar dolor y un leve sangrado durante o después de las relaciones sexuales. Es importante que, ante la presencia de estos síntomas, se consulte al médico o ginecólogo cuanto antes para realizar una evaluación del cuello uterino, detectar el origen de esta herida y establecer el tratamiento más adecuado. ¿Cuál es la relación entre ectropion cervical y embarazo? Algunas mujeres con ectropión cervical pueden tener problemas para quedarse embarazadas. El motivo es que esta afección puede alterar el pH de la vagina, dificultando que los espermatozoides puedan avanzar y llegar al útero. Además, si la herida está abierta o se produce una infección, las bacterias pueden llegar a las trompas de Falopio y causar enfermedad inflamatoria pélvica. Esto ocurre únicamente en los casos más graves: cuando el ectropion cervica es leve, no suele ocasionar embarazo. Otra cuestión relevante es la prevalencia de ectropion cervical en el embarazo debido a los importantes cambios hormonales que se producen durante este periodo en el cuerpo de la mujer. En este caso, la mujer debe acudir al ginecólogo para que le indique el mejor tratamiento. ¿Tienes dudas sobre tu salud reproductiva o quieres someterte a nuestras técnicas de reproducción asistida en Valencia? Contacta con nosotros en Valencia para una consulta personalizada el 9 de septiembre de 2014 a las 11-12 por Dra. Marta Marnet. Es un tejido que se encuentra fuera de su sitio habitual como consecuencia de estímulos hormonales como los presentes al iniciar las menstruaciones o por los embarazos. Se caracteriza por producir mucho flujo y ser un tejido más frágil que el que cubre habitualmente el cuello. El cuello del útero está formado por dos regiones: una interna o endocérvix y una externa o exocérvix. El endocérvix está recubierto por tejido epitelial columnar glandular, a partir del cual se pueden desarrollar tumores conocidos como adenocarcinomas. El exocérvix se compone de epitelio estratificado, que puede dar lugar a tumores llamados carcinomas. Durante la pubertad el epitelo glandular del endocérvix evierte hacia la región externa del cérvix: este proceso es conocido como eversion glandular. También aparece en mujeres que toman anticonceptivos y se considera un proceso normal. Sin embargo, con mucha frecuencia las mujeres con eversion glandular están infectadas por Virus del Papiloma Humano o VPH. Su origen Existe el ectropion cuando el cuello del útero tiene su superficie exterior recubierta por un tejido o epitelo cilíndrico monoestratificado. En condiciones normales, este tejido únicamente recubre el endocervix, es decir, el interior del cérvix, y no su parte externa. El principal origen de la eversion glandular está relacionado con las infecciones de transmisión sexual, así como la carga hormonal durante el embarazo y la ingesta de anticonceptivos. Es frecuente Se presenta en el 20 al 50% de todas las mujeres con vida sexual activa entre los 18 y 50 años. La eversion glandular es un fenómeno normal que se puede presentar en todas las mujeres y depende del estado hormonal. Diagnóstico Los métodos de diagnóstico inicial son la observación directa o a través de la colposcopia. Su persistencia y recurrencia pueden ser la base para la generación de lesiones precursoras del cáncer que se originan a partir de los epitelios plano estratificado o glandular del cuello uterino. No se trata de nada maligno, cuando hay infecciones repetidas parte de la mucosa del interior del cuello uterino se sale y es lo que se llama eversion. No se trata de un diagnóstico de gravedad. Consecuencias de la eversion glandular Puede provocar infecciones o cervicitis, que pueden afectar con mayor frecuencia un cuello de útero alterado. El ectropión crea un desequilibrio en el interior del ecosistema vaginal y puede hacer que los microorganismos presentes en la vagina, que generalmente son inofensivos, proliferen de una manera anormal y se vuelvan agresivos. Un cérvix con ectropión es más vulnerable a las infecciones, que pueden llegar a la vagina durante las relaciones sexuales. En algunos casos, el cérvix se inflama y en estos casos la infección puede extenderse hasta las trompas de falopio y los ovarios, con el riesgo de producirles daños. A veces, se pueden detectar manchas de sangre, sobre todo después de haber tenido relaciones sexuales. El tratamiento debe establecerlo el ginecólogo: puede consistir en una cura antibiótica local, mediante pomadas u óvulos, o por vía oral. Por regla general, una higiene íntima correcta y el empleo de preservativos son suficientes para reducir de una forma muy notable el riesgo de sufrir una cervicitis. ¿Provocan cáncer de cuello del útero? No, las úlceras no generan cáncer del cuello uterino. El tejido de la úlcera o eversion glandular es un tejido sano que se encuentra fuera de su sitio habitual y por ello provoca mucho flujo. Tratamiento Tanto la crioterapia como la cauterización pueden eliminarla por completo. No provoca alteraciones en la fertilidad de la mujer. El tratamiento sólo está indicado en aquellos casos en los que el ectropión provoque repetidas infecciones en el cuello del útero o cervix. Para eliminar esta anomalía es necesario recurrir a la cauterización: consiste en quemar el tejido anormal para conseguir que se forme uno nuevo de características normales. Tipos de cauterización Los métodos que se emplean en la actualidad para tratar este problema son la diatermocoagulación (el método más empleado y se efectúa en el consultorio, no requiere anestesia y sólo produce una ligera molestia), el láser (no se considera un método completamente eficaz para tratar este problema, pues la posición del cérvix no siempre permite que el haz de luz alcance la zona de una manera adecuada), el LEEP (se recurre a esta técnica sólo en casos muy especiales cuando se descubren células que podrían degenerar en células atípicas) o la crioterapia (se aplica sobre el cérvix una pequeña cantidad de nitrógeno líquido, que actúa eliminando el tejido anómalo, se practica en el consultorio, no requiere anestesia y sólo provoca una ligera molestia). Haber más Resultados anormales del papanicolaú Última actualización: 29 de septiembre de 2014 a las 11:12 por Dra. Marta Marnet. Es un tejido que se encuentra fuera de su sitio habitual como consecuencia de estímulos hormonales como los presentes al iniciar las menstruaciones o por los embarazos. Se caracteriza por producir mucho flujo y ser un tejido más frágil que el que cubre habitualmente el cuello. El cuello del útero está formado por dos regiones: una interna o endocérvix y una externa o exocérvix. El endocérvix está recubierto por tejido epitelial columnar glandular, a partir del cual se pueden desarrollar tumores conocidos como adenocarcinomas. El exocérvix se compone de epitelio estratificado, que puede dar lugar a tumores llamados carcinomas. Durante la pubertad el epitelo glandular del endocérvix evierte hacia la región externa del cérvix: este proceso es conocido como eversion glandular. También aparece en mujeres que toman anticonceptivos y se considera un proceso normal. Sin embargo, con mucha frecuencia las mujeres con eversion glandular están infectadas por Virus del Papiloma Humano o VPH. Su origen Existe el ectropion cuando el cuello del útero tiene su superficie exterior recubierta por un tejido o epitelo cilíndrico monoestratificado. En condiciones normales, este tejido únicamente recubre el endocervix, es decir, el interior del cérvix, y no su parte externa. El principal origen de la eversion glandular está relacionado con las infecciones de transmisión sexual, así como la carga hormonal durante el embarazo y la ingesta de anticonceptivos. Es frecuente Se presenta en el 20 al 50% de todas las mujeres con vida sexual activa entre los 18 y 50 años. La eversion glandular es un fenómeno normal que se puede presentar en todas las mujeres y depende del estado hormonal. Diagnóstico Los métodos de diagnóstico inicial son la observación directa o a través de la colposcopia. Su persistencia y recurrencia pueden ser la base para la generación de lesiones precursoras del cáncer que se originan a partir de los epitelios plano estratificado o glandular del cuello uterino. No se trata de nada maligno, cuando hay infecciones repetidas parte de la mucosa del interior del cuello uterino se sale y es lo que se llama eversion. No se trata de un diagnóstico de gravedad. Consecuencias de la eversion glandular Puede provocar infecciones o cervicitis, que pueden afectar con mayor frecuencia un cuello de útero alterado. El ectropión crea un desequilib

